

من المعرضون لخطر الإصابة بالحصبة؟

الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بضعف الجهاز المناعي والذين لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة هم أكثر عرضة للإصابة بالحصبة ومضاعفاتها. الأفراد الذين ولدوا في عام 1970 أو بعده ولم يتلقوا جرعتين من لقاح الحصبة (لقاح MMR أو MMRV) معرضون للخطر أيضاً، إلى جانب أولئك الذين لم يتعرضوا لعدوى مؤكدة بالحصبة، ومن سافروا إلى مناطق ينتشر فيها مرض الحصبة، ومن خالطوا حالة مؤكدة للإصابة بالحصبة.

كيف يمكن الوقاية من الحصبة؟

أفضل طريقة للوقاية من الحصبة هي أن يتلقى جميع الأفراد جرعتين من لقاح الحصبة (لقاح MMR أو MMRV). هذا اللقاح آمن ومجاني لمن يعيشون ويعملون ويرتدون المدارس في أونتاريو. يمكنك الحصول على اللقاح من مقدم الرعاية الصحية المتابع لك. إلى جانب اللقاحات، هناك إجراءات مهمة أخرى يمكنك اتخاذها لحماية نفسك والآخرين:

- غط سعالك وعطسك بمنديل
- اغسل يديك كثيراً
- حافظ على التباعد عند السفر أو حضور فعاليات جماعية كبيرة
- أبق في المنزل عندما تكون مريضاً

ماذا أفعل إذا ظنت أنني مصاب بالحصبة؟

إذا ظهرت عليك أو على أحد أفراد أسرتك علامات وأعراض الحصبة، فمن المهم أن:

- تعزل نفسك فوراً بالبقاء في المنزل وتجنب مخالطة الآخرين.
- تتصل قبل مراجعة العيادة أو المستشفى حتى يتمكنوا من الاستعداد لوصولك ومنع انتشار الفيروس.
- ترتدي قناعاً مناسباً وعالي الجودة عند طلب التقييم الطبي.

سيقوم مقدم الرعاية الصحية المتابع لك بتقييم إصابتك بالحصبة وسيخضعك لفحوص إذا اشتبه في إصابتك بالحصبة.

ما الحصبة؟

الحصبة (وتسمى أيضاً الحصبة الحمراء أو الحصبة الألمانية) هي عدوى يسببها فيروس الحصبة. ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة لدى الأطفال والبالغين، فتؤدي في بعض الحالات إلى تورم الدماغ والالتهاب الرئوي ومضاعفات نفسية أخرى، وحتى الوفاة. قد تسبب الحصبة في النساء الحوامل اللاتي لم يتلقين لقاح MMR في الولادة قبل الأوان أو إنجاب طفل منخفض الوزن عند الولادة.



ما أعراض الحصبة؟

قد تظهر أعراض الحصبة بعد 7 إلى 21 يوماً من مخالطة شخص مصاب أو استنشاق هواء ملوث بالعدوى. قد تشمل الأعراض الحمى وسلام الأنف والسعال والنعاس والتهيج واحمرار العينين. يظهر طفح جلدي أحمر على الوجه بعد 3 إلى 7 أيام من بداية الأعراض المذكورة أعلاه. وبعد ذلك ينتشر الطفح الجلدي إلى أسفل الجسم. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، اعزل نفسك واتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك.

كيف تنتشر الحصبة؟

الحصبة معدية للغاية وتنتشر من شخص لآخر عن طريق قطرات سوائل أنف وحنجرة شخص مصاب بالمرض (مثل السعال أو العطس). ينشر الشخص المصاب المرض لأكثر من 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي إلى 4 أيام بعده.

هل هناك علاج؟

لا يوجد علاج محدد للحصبة. تُعطى العلاجات المساعدة في تخفيف أعراض الحصبة (مثل مسكنات الألم لتقليل الحمى). كثيراً ما تُعالج حالات عدوى الحصبة الشديدة في المستشفيات. يمكن لمعظم الأشخاص التعافي في المنزل عن طريق شرب الكثير من السوائل، وتناول الأطعمة الصحية، والحصول على كثير من الراحة. يُنصح المصاب بالحصبة بالبقاء في المنزل، وعدم الذهاب إلى الحضانة أو المدرسة أو العمل، لأن الحصبة معدية للغاية.

